

階乗の厳密な式

階乗の厳密な式の導き方を、簡単な例により示す。

3!=1・2・3の場合、 $e^{\{1n^1+1n^2+1n^3\}}$ と変形すれば指数部は加算となるが、自然対数の取り扱いが難しい。それに対してsin関数を経由させた場合は、以下で見る様に取り扱いが簡単になる。

3!=6を例に値を確認しながら、式を変形していく。(確認では本来∞まで計算すべき所を、途中で打ち切っているの、概算値となる。計算結果は指定桁での切り捨て表示をしている。)

1・2・3= 6 の式を変形する。 $\prod_{k=1}^{n-1} 2\sin\frac{k\pi}{2n} = \sqrt{n}$ の公式より

$(2\sin\frac{1\pi}{6})(2\sin\frac{2\pi}{6}) = \sqrt{3}$ と $2\sin\frac{3\pi}{6} = 2$ を利用して

$$2\sqrt{3} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{(2\sin\frac{1\pi}{6})(2\sin\frac{2\pi}{6})(2\sin\frac{3\pi}{6})} = 5.9999999999$$

$$\frac{2\sqrt{3} 6^3}{\pi^3} \frac{\frac{1\pi}{6} \frac{2\pi}{6} \frac{3\pi}{6}}{(2\sin\frac{1\pi}{6})(2\sin\frac{2\pi}{6})(2\sin\frac{3\pi}{6})} = 5.9999999999$$

sin関数の乗積化式

$$\left(\sin\frac{k\pi}{2n}\right) / \left(\frac{k\pi}{2n}\right) = \prod_{m=1}^{\infty} \frac{(2nm)^2 - k^2}{(2nm)^2}$$

n=3 k=2 $\left(\sin\frac{k\pi}{2n}\right) / \left(\frac{k\pi}{2n}\right) = 0.8269933431$

$$\prod_{m=1}^{10^6} \frac{(2nm)^2 - k^2}{(2nm)^2} = 0.8269934350$$

を使用すると

inf=10³

$$\frac{2\sqrt{3} 3^3}{\pi^3} \left(\prod_{m=1}^{\text{inf}} \frac{(6m)^2}{(6m)^2 - 1^2}\right) \left(\prod_{m=1}^{\text{inf}} \frac{(6m)^2}{(6m)^2 - 2^2}\right) \left(\prod_{m=1}^{\text{inf}} \frac{(6m)^2}{(6m)^2 - 3^2}\right) = 5.9976682860$$

$$\frac{2\sqrt{3} 3^3}{\pi^3} \exp\left\{\ln\left(\left(\prod_{m=1}^{\text{inf}} \frac{(6m)^2}{(6m)^2 - 1^2}\right) \left(\prod_{m=1}^{\text{inf}} \frac{(6m)^2}{(6m)^2 - 2^2}\right) \left(\prod_{m=1}^{\text{inf}} \frac{(6m)^2}{(6m)^2 - 3^2}\right)\right)\right\} = 5.9976682860 \quad \exp\{x\} \equiv e^x$$

$$\frac{2\sqrt{3} 3^3}{\pi^3} \exp\left\{\sum_{m=1}^{\text{inf}} \ln\frac{(6m)^2}{(6m)^2 - 1^2} + \sum_{m=1}^{\text{inf}} \ln\frac{(6m)^2}{(6m)^2 - 2^2} + \sum_{m=1}^{\text{inf}} \ln\frac{(6m)^2}{(6m)^2 - 3^2}\right\} = 5.9976682860$$

自然対数の展開式を縦の列毎に加算すると、ζ(2m)を使用した項になる。

$$\ln\frac{6^2}{6^2 - k^2} = \frac{1}{1} \left(\frac{k}{6}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{k}{6}\right)^4 + \frac{1}{3} \left(\frac{k}{6}\right)^6 + \dots$$

k=2 $\sum_{m=1}^{100} \frac{1}{m} \left(\frac{k}{6}\right)^{2m} = 0.1177830356$

$$\ln\frac{12^2}{12^2 - k^2} = \frac{1}{1} \left(\frac{k}{12}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{k}{12}\right)^4 + \frac{1}{3} \left(\frac{k}{12}\right)^6 + \dots$$

$$\ln\frac{6^2}{6^2 - k^2} = 0.1177830356$$

$$\ln\frac{18^2}{18^2 - k^2} = \frac{1}{1} \left(\frac{k}{18}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{k}{18}\right)^4 + \frac{1}{3} \left(\frac{k}{18}\right)^6 + \dots$$

$$\sum_{m=1}^{10^4} \ln\frac{(6m)^2}{(6m)^2 - k^2} = 0.1899475228$$

$$\sum_{m=1}^{100} \frac{\zeta_{-}(2m) k^{2m}}{m \cdot 6^{2m}} = 0.1899586334$$

$$\begin{matrix} \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \frac{\zeta_{-}(2)k^2}{1 \cdot 6^2} & + & \frac{\zeta_{-}(4)k^4}{2 \cdot 6^4} & + & \frac{\zeta_{-}(6)k^6}{3 \cdot 6^6} + \dots \end{matrix}$$

ζ₋(x)はユーザー定義のゼータ関数であり、正の奇数以外の整数点での値を返す。

単純化するために分母の係数を四捨五入で整数にした式 $g_9(n)$ と、スターリングの公式 $s_9(n)$ を比較する。

$$g_9(n) = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left\{\frac{1}{12n} - \frac{1}{375n^3} + \frac{1}{1853n^5} - \frac{1}{7666n^7} + \frac{1}{67517n^9}\right\}$$

$$s_9(n) = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left\{\frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \frac{1}{1260n^5} - \frac{1}{1680n^7} + \frac{1}{1188n^9}\right\}$$

$$g_9(3) = 6.0000194917$$

$$s_9(3) = 6.0000000484$$

$1/n^9$ までの式は、 $n=3$ ではスターリングの公式の方が精度が良い。

スターリングの公式は n が小さいと精度が悪くなる。それに対して厳密な式の係数単純化式は、小さな n に対してもある程度正確な値になる。

$$g_9(1) = 1.0000292306$$

$$g_9(1/2) = 0.8862822169$$

$$s_9(1) = 1.0005343950$$

$$s_9(1/2) = 1.2845629930$$

$$\Gamma(1+1/2) = 0.8862269254 = \sqrt{\pi}/2$$

$1/n^7$ までの式を同様に求めると

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left\{\frac{\zeta_{-}(2)}{1 \cdot 2^2} \left(\frac{1}{6n}\right) + \frac{\zeta_{-}(4)}{2 \cdot 2^4} \left(\frac{1}{3n} - \frac{1}{30n^3}\right) + \frac{\zeta_{-}(6)}{3 \cdot 2^6} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{6n^3} + \frac{1}{42n^5}\right) + \frac{\zeta_{-}(8)}{4 \cdot 2^8} \left(\frac{2}{3n} - \frac{7}{15n^3} + \frac{2}{9n^5} - \frac{1}{30n^7}\right)\right\} = 5.999624686387023382542324$$

$$h7(j) = \frac{\zeta_{-}(2)}{1 \cdot 2^2} \left(\frac{\delta_{j,1}}{6}\right) + \frac{\zeta_{-}(4)}{2 \cdot 2^4} \left(\frac{\delta_{j,1}}{3} - \frac{\delta_{j,3}}{30}\right) + \frac{\zeta_{-}(6)}{3 \cdot 2^6} \left(\frac{\delta_{j,1}}{2} - \frac{\delta_{j,3}}{6} + \frac{\delta_{j,5}}{42}\right) + \frac{\zeta_{-}(8)}{4 \cdot 2^8} \left(\frac{2\delta_{j,1}}{3} - \frac{7\delta_{j,3}}{15} + \frac{2\delta_{j,5}}{9} - \frac{\delta_{j,7}}{30}\right)$$

$$h7(1) = 0.0831161468$$

$$1/h7(1) = 12.031356570621$$

$$h7(3) = -0.0024681176$$

$$1/h7(3) = -405.167068266959$$

$$h7(5) = 0.0003440573$$

$$1/h7(5) = 2906.49222474074$$

$$h7(7) = -0.0000326848$$

$$1/h7(7) = -30595.2522585758$$

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left\{\sum_{m=1}^4 \frac{h7(2m-1)}{n^{2m-1}}\right\} = 5.999624686387023382542324$$

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left\{\frac{1}{12.031356570621n} - \frac{1}{405.167068266959n^3} + \frac{1}{2906.49222474074n^5} - \frac{1}{30595.2522585758n^7}\right\} = 5.9996246863870246516$$

係数を単純化した式は

$$g_7(n) = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left\{\frac{1}{12n} - \frac{1}{405n^3} + \frac{1}{2906n^5} - \frac{1}{30595n^7}\right\}$$

$$g_7(3) = 6.0000588230$$

$$g_7(1) = 1.0001141677$$

$$g_7(1/2) = 0.8865062907$$

$1/n^5$ までの式を同様に求めると

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left\{\frac{\zeta_{-}(2)}{1 \cdot 2^2} \left(\frac{1}{6n}\right) + \frac{\zeta_{-}(4)}{2 \cdot 2^4} \left(\frac{1}{3n} - \frac{1}{30n^3}\right) + \frac{\zeta_{-}(6)}{3 \cdot 2^6} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{6n^3} + \frac{1}{42n^5}\right)\right\} = 5.9984138874698323146$$

$$h_5(j) = \frac{\zeta_-(2)}{1 \cdot 2^2} \left(\frac{\delta_{j,1}}{6} \right) + \frac{\zeta_-(4)}{2 \cdot 2^4} \left(\frac{\delta_{j,1}}{3} - \frac{\delta_{j,3}}{30} \right) + \frac{\zeta_-(6)}{3 \cdot 2^6} \left(\frac{\delta_{j,1}}{2} - \frac{\delta_{j,3}}{6} + \frac{\delta_{j,5}}{42} \right)$$

$$\begin{aligned} h_5(1) &= 0.0824624506 \\ h_5(3) &= -0.0020105303 \\ h_5(5) &= 0.0001261586 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1/h_5(1) &= 12.126731519462 \\ 1/h_5(3) &= -497.381205393973 \\ 1/h_5(5) &= 7926.52970402157 \end{aligned}$$

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \exp \left\{ \sum_{m=1}^3 \frac{h_5(2m-1)}{n^{2m-1}} \right\} = 5.9984138874698323146$$

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \exp \left\{ \frac{1}{12.126731519462n} - \frac{1}{497.381205393973n^3} + \frac{1}{7926.52970402157n^5} \right\} = 5.9984138874698324911$$

係数を単純化した式は

$$g_5(n) = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \exp \left\{ \frac{1}{12n} - \frac{1}{497n^3} + \frac{1}{7927n^5} \right\}$$

$$g_5(3) = 6.0001551021$$

$$g_5(1) = 1.0003860197$$

$$g_5(1/2) = 0.8872737461$$

1/n³までの式を同様に求めると

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \exp \left\{ \frac{\zeta_-(2)}{1 \cdot 2^2} \left(\frac{1}{6n} \right) + \frac{\zeta_-(4)}{2 \cdot 2^4} \left(\frac{1}{3n} - \frac{1}{30n^3} \right) \right\} = 5.9933118780643904897$$

$$h_3(j) = \frac{\zeta_-(2)}{1 \cdot 2^2} \left(\frac{\delta_{j,1}}{6} \right) + \frac{\zeta_-(4)}{2 \cdot 2^4} \left(\frac{\delta_{j,1}}{3} - \frac{\delta_{j,3}}{30} \right)$$

$$\begin{aligned} h_3(1) &= 0.0798131198 \\ h_3(3) &= -0.0011274200 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1/h_3(1) &= 12.5292684018137 \\ 1/h_3(3) &= -886.980866804726 \end{aligned}$$

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \exp \left\{ \sum_{m=1}^2 \frac{h_3(2m-1)}{n^{2m-1}} \right\} = 5.9933118780643904897$$

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \exp \left\{ \frac{1}{12.5292684018137n} - \frac{1}{886.980866804726n^3} \right\} = 5.9933118780643915855$$

係数を単純化した式は

$$g_3(n) = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \exp \left\{ \frac{1}{13n} - \frac{1}{887n^3} \right\}$$

$$g_3(3) = 5.9875410208$$

$$g_3(1) = 0.9947480543$$

$$g_3(1/2) = 0.8786385610$$

1/nまでの式は $\frac{\zeta_-(2)}{1 \cdot 2^2} \left(\frac{1}{6} \right) = 0.0685389194520094$ $1/0.0685389194520094 = 14.5902504444966$ より

$$g_1(n) = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \exp \left\{ \frac{1}{15n} \right\}$$

$$g_1(3) = 5.9673549111$$

$$g_1(1) = 0.9857083096$$

$$g_1(1/2) = 0.8685976068$$

厳密な階乗の式は、項数により指数部の1/n^{2m-1}に対する係数が変化するという特徴がある。